

د UVMCC څيړونکي د ټپي شويو سرتيرو او ملکي وگړو لپاره د خوندي درد مدیریت ارزونې ملي مطالعې سره يوځای کيږي.

د Vermont پوهنتون څيړونکي د روغتون څخه دمخه د درد د آرامولو مداخلې (PAIN) آزمایښت کې برخه اخلي کوم چې د Pittsburgh پوهنتون لخوا ترسره کيږي او د دفاع وزارت لخوا مالي تمويل يې کيږي. څيړنه د دوه درملو اغيزمنتوب او خونديتوب پرته کوي چې معمولا په سرتيرو او ملکي وگړو کې د ټپي کيدو وروسته د درد درملنې لپاره کارول کيږي.

ددې دواړو درملو څخه يو يې Fentanyl دی، چې افین يا ترياک دی، او ټيټ دوز لرونکی Ketamine، چې دا بيهوشي ده. دا څيړنه چې د 2024 په مني موسم کې پيل کيږي د Daniel Wolfson لخوا رهبري کيږي، MD (طبي ډاکټر)، د بېرني درملو اسوسيت پروفیسور، Ajai Malhotra، طبي ډاکټر، د جراحي پروفیسور او د صدماتو طبي رئيس په UVMCC کې د I-کچې صدماتو مرکز مشر.

همدا اوس، دواړه درمل عموماً په Vermont کې د روغتون څخه دمخه د خدماتو چمتو کونکو لخوا کارول کيږي ترڅو د ټپي کيدو وروسته درد کم کړي. په هرصورت، موږ لا تر اوسه نه پوهيږو چې کوم درمل د درد په کمولو کې ډير اغيزمن دي او د ناوړه يا خطرناکو اړخيزو اغيزو په مخنيوي کې خوندي دي. څيړنه به د دې پوښتنو په ځوابولو کې مرسته وکړي او همدارنگه په ساحه کې د ټپي شويو سرتيرو او د ورمونت پوهنتون اشخاصو په گډون د عامو خلکو لپاره به گټور وي. دا مطالعه د هغو مطالعاتو يوه لړۍ ده چې د دفاع وزارت لخوا تمويل شوي د صدماتو او بېرني خدماتو (LITES - www.litesnetwork.org) شبکې له لارې د کلينيکي تمرین لارښودونو خبر رسولو او د صدماتو ټپونو پاملرنې لپاره موجوده معيارونه تازه کوي.

”Fentanyl معمولاً د صدماتو لرونکو ناروغانو کې د درد درملنې لپاره کارول کيږي مگر کولی شي د اکسيجن کچه او د وينې فشار ټيټ کړي، په احتمالي توگه د ټپي شوي شخص حالت خرابوي او ځينې وختونه د تنفس ټيوب ته اړتيا لري. د اوږدې مودې افین يا ترياک انحصار خطر هم شتون لري. د ټيټ دوز ketamine د درد په اداره کولو کې اغيزمن دی او ممکن د افينو يا ترياکو سره تړلي خطرونه کم کړي، مگر کيدای شي د جانبي عوارضو لکه وهمونه، اضطراب، او د جلا کيدو احساس رامنځته کړي،“ ډاکټر Wolfson وويل. دا ستونزه په پوځ کې په لويه کچه ده. ”موخه دا ده چې له اردو سره مرسته وشي ترڅو زموږ د ټپي شوي پرسونل لپاره غوره پاملرنې خدمات چمتو کړي، د درد کمولو لپاره د خورا اغيزمن درمل په ټاکلو او همدارنگه هغه يو چې لږ تر لږه زیانمنونکي لنډ او اوږد مهاله اړخيزي اغيزې لري.“ ډاکټر Malhotra زياته کړه.

مطالعه به په متحده ايالاتو کې د دولسو لويو اکادميکو طبي مرکزونو څخه شاوخوا 1000 ټپي شوي ناروغان په مطالعه کې شامل کړي چې د LITES شبکې برخه دي. دا گډون کوونکي ناروغان به په تصادفي ډول د ټپي کيدو وروسته د درد کمولو لپاره يا هم Fentanyl او يا ټيټ دوز لرونکي Ketamine ترلاسه کړي. ټول گډون کوونکي ناروغان به د درد د کمولو اغيزمنتيا او لنډ او اوږدمهاله اړخيزو عوارضو په پار په پوره دقت سره تر څارنې لاندې ونيول شي. ”Ketamine او Fentanyl دواړه دمخه په Vermont کې د بېرني طبي خدماتو لخوا د درد مدیریت لپاره د معياري درملنې په توگه کارول شوي دي. دا څيړنه به موږ سره مرسته وکړي ترڅو دا په گوته کړو چې کوم درمل د خطرونو کمولو پر مهال غوره پاملرنه چمتو کوي،“ ډاکټر Wolfson يادونه وکړه.

هرڅوک کولی شي د څیړنې ټیم سره په 1-800-664-0557 شمیره باندې اړیکې نیولو له لارې د مطالعې څخه ځان بهر کړي یا د PAINStudy@edc.pitt.edu بریښنالیک ته د "د PAIN په مطالعه کې ګډون نه کول" لیرولو له لارې ځان له څیړنې څخه بهر کړي. د نورو معلوماتو لپاره www.ClinicalTrials.gov ته ولاړ شئ او NCT05437575 ته مراجعه وکړئ. د ورمونټ پوهنتون اشخاصو لپاره دا مهمه ده ترڅو پوه شي چې د څیړنې څخه بهر کېدل غوره کول به ټیپي شوي ناروغان د پاملرنې معیار سره سم د درد درملو ترلاسه کولو مخه ونه نیسي، یوازې په مطالعې کې د نوم لیکنې څخه.

دا څیړنه د دفاع وزارت د DoD د W81XWH-16-D-0024 W81XWH-19-F-0539 تړون لخوا ملاتړ کیږي. په دې موادو کې څرګند شوي نظرونه یا سپارښتنې د لیکوالانو نظرونه دي او اړینه نه ده چې د دفاع وزارت نظرونه منعکس کړي.